

Oksiyür(Kıl Kurdu) nedir?

Bulaşma yolları:

- Kirli su ve iyi yıkanmamış sebzeler
- Ortak kullanılan musluklar
- Yumurtaların bulaştığı çarşaf, çamaşır ve yüzeyler



Belirtileri nelerdir?

- Makatta veya burunda kaşıntı
- Karın ağrısı, gaz, geçici ishal
- Dışkı yapısında değişiklik (kokulu, keçi pisliği gibi)
- Ağız kokusu, sabah bulantısı
- Diş gıcırdatma, iştahsızlık veya aşırı yeme
- Vücutta kaşıntılı döküntüler
- Ağız çevresinde solukluk

 Bu belirtilerden 2 veya daha fazlası varsa parazit tahlili yaptırılmalıdır. Bant yöntemi daha güvenilir sonuç verebilir.



Tedavi ve Önlemler

- Tüm aile bireyleri aynı anda tedavi edilmelidir.
- İlaç alındığı gün:
 - Çarşaf ve iç çamaşırları kaynatılmalı (100 °C)
 - İç çamaşırları kızgın ütüyle ütülenmeli
- Tırnaklar kısa tutulmalı, tuvalet sonrası temizlik dikkatli yapılmalı
- Ortak musluklara temas azaltılmalı, sıvı sabun tercih edilmeli
- Sular kaynatılarak içilmeli
- Dışarıda sunulan yeşillikler/mevsim meyveleri şüpheliyse tüketilmemeli
- ☑ Şikayetler sürüyorsa 3 haftadan önce olmamak şartıyla tekrar doktora başvurulmalıdır.

